


ANWENDUNGSHINWEIS ZUR ABGABE AN DEN PATIENTEN NACH VERSCHREIBUNG UND NACH SCHULUNG

Bewahren Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten gelben Röhrchen auf und ziehen Sie auch NICHT die Folie ab. Dadurch bleibt BAQSIMI vor Feuchtigkeit geschützt. Wenn das Arzneimittel feucht wird, kann es sein, dass es weniger oder gar nicht wirksam ist. Das Entfernen der Folie und das Öffnen des gelben Röhrchens darf erst unmittelbar vor der Anwendung erfolgen.



Zur nasalen Anwendung nur zum einmaligen Gebrauch



- Halten Sie das Einzeldosisbehältnis zwischen den Fingern.
- BAQSIMI enthält nur eine Dosis Glukagon. Deshalb zunächst NICHT den Kolben (A) drücken und NICHT das Einzeldosisbehältnis testen.



- Schieben Sie die Spitze des Behältnisses (B) behutsam in ein Nasenloch, bis ein Finger die Außenseite der Nase berührt.



- Drücken Sie jetzt den Kolben (A) vollständig durch.
- Die Dosis wurde vollständig verabreicht, wenn der grüne Streifen am Kolben nicht mehr sichtbar ist.

Nach Verabreichen der Dosis:

- Falls die Person bewusstlos ist, bringen Sie diese nach der Gabe von BAQSIMI in die stabile Seitenlage.
- Fordern Sie umgehend medizinische Hilfe an.
- Wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist, halten Sie diese dazu an, so schnell wie möglich einen Imbiss oder ein Getränk mit hohem Zuckergehalt zu sich zu nehmen, wie z.B. Traubenzucker oder Fruchtsaft.
- Entsorgen Sie das gebrauchte Einzeldosisbehältnis und das gelbe Röhrchen.

Dieser Anwendungshinweis ist verpflichtender Teil der Zulassung von BAQSIMI 3 mg Nasenpulver und wurde als zusätzliche risikominimierende Maßnahme beauftragt. Auf diese Weise soll das Risiko einer unsachgemäßen Anwendung des Einzeldosisbehältnisses minimiert werden, sodass es nicht zu einem Ausbleiben der Arzneimittelwirkung kommt.

WEITERE HINWEISE

- Zeigen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo Sie BAQSIMI aufbewahren und erklären Sie ihnen anhand dieser Anweisungen, wie es anzuwenden ist. Diese müssen wissen, wie es anzuwenden ist, bevor Sie es benötigen. Bitte nutzen Sie hierzu auch das im Internet verfügbare BAQSIMI-Schulungsvideo, Link und QR-Code sind unten angegeben.
- BAQSIMI enthält nur eine Dosis Glukagon – entlüften Sie das Einzeldosisbehältnis daher NICHT und drücken Sie daher NICHT den Kolben, bevor Sie die Spitze des Behältnisses in das Nasenloch eingeführt haben.
- Für detaillierte Informationen in Bezug auf die Anwendung und die Handhabung von BAQSIMI lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation und Bedienungsanleitung.



Hier kommen Sie zum BAQSIMI-Schulungsvideo:

Einfach den QR-Code scannen
oder dem Link folgen
www.lilly-pharma.de/Baqsimi_Video

MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können Nebenwirkungen oder Beschwerden über die Produktqualität von BAQSIMI auch direkt anzeigen an die

Lilly Deutschland GmbH | Werner-Reimers-Str. 2-4 | 61352 Bad Homburg | Tel.: 06172 – 273 2222 | Fax: 06172 – 273 2446

oder an das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | Abt. Pharmakovigilanz | 53175 Bonn | Website: www.bfarm.de

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

