

# Cynt 0,3

## 0,3 mg Filmtabletten

### Wirkstoff: Moxonidin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Cynt 0,3 und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cynt 0,3 beachten?
3. Wie ist Cynt 0,3 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cynt 0,3 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

---

### 1. Was ist Cynt 0,3 und wofür wird es angewendet?

Cynt 0,3 enthält einen Wirkstoff mit der Bezeichnung Moxonidin. Dieses Arzneimittel gehört zur Gruppe der so genannten „Antihypertonika“.

Cynt 0,3 wird zur Behandlung des Bluthochdrucks (Hypertonie) verwendet. Es entspannt und erweitert Ihre Blutgefäße. Diese Wirkung trägt dazu bei, Ihren Blutdruck zu senken.

---

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cynt 0,3 beachten?

#### Cynt 0,3 darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Moxonidin oder einen der sonstigen Bestandteile von Cynt 0,3 sind (die in Abschnitt 6 aufgeführt sind),
- wenn Ihr Herzschlag verlangsamt ist und dies durch ein Herzproblem mit der Bezeichnung „Sick-Sinus-Syndrom“ oder „AV-Block 2. oder 3. Grades“ hervorgerufen wird,
- wenn Sie an Herzinsuffizienz leiden.

Sie dürfen Cynt 0,3 nicht einnehmen, wenn Sie an einer der oben genannten Erkrankungen leiden. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker, bevor Sie Cynt 0,3 nehmen.

#### Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cynt 0,3 ist erforderlich:

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Ihr Medikament nehmen, wenn:

- Sie an einem Herzproblem mit der Bezeichnung „AV-Block 1. Grades“ leiden,
- Sie an einer schweren Herzarterienerkrankung oder instabilen Herzschmerzen (Angina) leiden,
- Sie Nierenprobleme haben. Möglicherweise muss Ihr Arzt Ihre Dosis anpassen.

Wenn Sie an einer der oben genannten Erkrankungen leiden (oder Sie nicht sicher sind), fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cynt 0,3 nehmen.

---

### Bei Einnahme von Cynt 0,3 mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel einschließlich pflanzlicher Arzneimittel handelt. Denn Cynt 0,3 kann die Wirkungsweise anderer Arzneimittel beeinflussen. Andere Arzneimittel können wiederum die Wirkungsweise von Cynt 0,3 beeinflussen.

Teilen Sie Ihrem Arzt oder Apotheker insbesondere mit, ob Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Andere Arzneimittel zur Senkung Ihres Blutdrucks. Cynt 0,3 kann die Wirkung dieser Arzneimittel erhöhen.
- Medikamente zur Behandlung von Depressionen wie z.B. Imipramin oder Amitriptylin.
- Tranquilizer, Beruhigungsmittel oder Schlaftabletten wie z.B. Benzodiazepine.
- Betablocker (siehe „Wenn Sie die Einnahme von Cynt 0,3 abbrechen“ in Abschnitt 3).
- Cynt 0,3 wird durch einen Prozess, der als „tubuläre Sekretion“ bezeichnet wird, über Ihre Nieren aus Ihrem Körper ausgeschieden. Andere Arzneimittel, die auf dem gleichen Weg über die Nieren ausgeschieden werden, können die Wirkungsweise von Cynt 0,3 beeinflussen.

Wenn Sie eines der oben genannten Arzneimittel einnehmen (oder Sie nicht sicher sind), fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Cynt 0,3 nehmen.

### Bei Einnahme von Cynt 0,3 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

- Die Tabletten können zu oder unabhängig von einer Mahlzeit eingenommen werden.
- Trinken Sie keinen Alkohol, während Sie Cynt 0,3 nehmen, da Cynt 0,3 die Wirkungen von Alkohol verstärken kann.

### Schwangerschaft und Stillzeit:

- Teilen Sie es Ihrem Arzt mit, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden könnten. Im Normalfall wird Ihr Arzt Ihnen raten, Cynt 0,3 abzusetzen. Ihr Arzt wird Ihnen empfehlen, ein anderes Arzneimittel an Stelle von Cynt 0,3 zu nehmen.
- Teilen Sie es Ihrem Arzt mit, wenn Sie stillen oder demnächst stillen werden. Cynt 0,3 wird für stillende Mütter nicht empfohlen. Ihr Arzt verordnet Ihnen möglicherweise ein anderes Medikament, wenn Sie stillen möchten, oder er rät Ihnen zum Abstillen.

Fragen Sie vor der Einnahme aller Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Während der Einnahme von Cynt 0,3 fühlen Sie sich möglicherweise schläfrig oder schwindlig. Wenn dies der Fall ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Auto fahren oder Werkzeuge bzw. Maschinen bedienen.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (eine Art Zucker). Bitte nehmen Sie Cynt 0,3 daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

---

### 3. Wie ist Cynt 0,3 einzunehmen?

Nehmen Sie Cynt 0,3 immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### Art der Anwendung:

- Schlucken Sie die Tabletten ganz mit einem vollen Glas Wasser.
- Versuchen Sie, Ihre Tabletten jeden Tag etwa zur selben Zeit zu nehmen. Dadurch werden Sie leichter an die Einnahme denken.

#### Wie viel Cynt 0,3 nehmen Sie?

- Die übliche Anfangsdosis beträgt 0,2 mg pro Tag.
- Ihr Arzt kann diese Dosis auf bis zu 0,6 mg pro Tag erhöhen.
- Wenn Ihr Arzt Ihnen 0,6 mg pro Tag verordnet hat, sollte diese Dosis in zwei Teilen verabreicht werden (0,3 mg morgens und 0,3 mg abends).
- Die maximale einzelne Dosis ist 0,4 mg.
- Ihr Arzt verordnet Ihnen eventuell eine niedrigere Dosis, wenn Sie Nierenprobleme haben.

#### Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:

Cynt 0,3 sollte Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht gegeben werden.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Cynt 0,3 eingenommen haben, als Sie sollten:

Wenn Sie eine größere Menge Cynt 0,3 eingenommen haben als Sie sollten, wenden Sie sich an einen Arzt oder suchen Sie sofort ein Krankenhaus auf. Nehmen Sie die Arzneimittelpackung mit. Die folgenden Wirkungen können auftreten: Kopfschmerzen; Schläfrigkeit (Somnolenz, Sedierung), Blutdruckabfall (Hypotonie), Verlangsamung des Herzschlags (Bradykardie), Benommenheit (Schwindel), Mundtrockenheit, Übelkeit (Erbrechen), Müdigkeit (Fatigue), Schwäche und Magenschmerzen (Schmerzen im Oberbauch).

#### Wenn Sie die Einnahme von Cynt 0,3 vergessen haben:

- Wenn Sie eine Dosis vergessen, nehmen Sie sie, sobald Sie daran denken. Falls es jedoch fast Zeit für die nächste Dosis ist, überspringen Sie die vergessene Dosis.
- Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### Wenn Sie die Einnahme von Cynt 0,3 abbrechen:

- Nehmen Sie Ihre Tabletten weiter, bis Ihr Arzt entscheidet, dass Sie die Einnahme abbrechen sollten.
- Wenn Sie die Einnahme beenden müssen, wird Ihr Arzt die Dosis über einige Wochen langsam verringern. Falls Sie mehrere Medikamente gegen Bluthochdruck (wie z. B. Betablocker) nehmen, teilt Ihr Arzt Ihnen mit, welches Medikament zuerst abgesetzt werden soll, damit Ihr Körper sich langsam an die Veränderung anpassen kann.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

---

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cynt 0,3 Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei diesem Arzneimittel können die folgenden Nebenwirkungen auftreten:

**Setzen Sie Cynt 0,3 ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie eine der folgenden schweren Nebenwirkungen bemerken – möglicherweise brauchen Sie dringende ärztliche Behandlung:**

- Schwellung des Gesichts, der Lippen oder des Mundes (Angioödem). Dies ist eine gelegentliche Nebenwirkung, die bei weniger als 1 von 100 Behandelten auftritt.

#### **Andere mögliche Nebenwirkungen:**

#### **Sehr häufig (betrifft mehr als 1 von 10 Behandelten)**

- Mundtrockenheit

#### **Häufig (betrifft weniger als 1 von 10 Behandelten)**

- Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen
- Schwäche (Asthenie)
- Benommenheit, Schwindelgefühl
- Hautrötung, Juckreiz (Pruritus)
- Schlafstörungen (Schlaflosigkeit), Schläfrigkeit
- Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Verdauungsstörungen.

#### **Gelegentlich (betrifft weniger als 1 von 100 Behandelten)**

- Nackenschmerzen
- Nervosität
- Ohnmachtsanfall (Synkope)
- Schwellung (Ödem)
- Klingeln oder Geräusche im Ohr (Tinnitus)
- ungewöhnlich langsamer Herzschlag (Bradykardie)
- niedriger Blutdruck, einschließlich Blutdruckabfall beim Aufstehen

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
D-53175 Bonn

Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

---

#### **5. Wie ist Cynt 0,3 aufzubewahren?**

---

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 30°C lagern.

- Sie dürfen Cynt 0,3 nach dem auf dem Umkarton und den Bliesterstreifen angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

---

#### **6. Weitere Informationen**

---

##### **Was Cynt 0,3 enthält:**

Der Wirkstoff ist Moxonidin.  
Jede Filmtablette enthält 0,3 mg Moxonidin.

Die sonstigen Bestandteile sind Lactose-Monohydrat, Povidon (K25), Crospovidon Typ A (Ph. Eur.), Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Hypromellose, Ethylcellulose, Macrogol 6000, Talkum, Eisen(III)-oxid, Titandioxid

##### **Wie Cynt 0,3 aussieht und Inhalt der Packung:**

Die Filmtabletten sind rund, rosa gefärbt und auf einer Seite mit der Kennzeichnung „0,3“ versehen.

Cynt 0,3 ist in Packungen mit 30, 50 oder 100 Filmtabletten erhältlich.

##### **Pharmazeutische Unternehmer:**

Lilly Pharma Produktion GmbH & Co. KG  
Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg

Lilly Deutschland GmbH  
Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg  
Telefon: 06172 / 273-2222

##### **Hersteller:**

Rottendorf Pharma GmbH  
Ostenfelder Straße 51-61, 59320 Ennigerloh

##### **Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:**

Mai 2014