

First-Line  
zugelassen

taltz®  
(Ixekizumab)

# TALTZ® – HOHE WIRKSAMKEIT BEI PSORIASIS VULGARIS PALMOPLANTARIS



\* PASI 75: 90%; PASI 90: 71%;  
PASI 100: 40%<sup>1</sup>

*Lilly*

taltz®  
(Ixekizumab)

BEFREIT.\*  
BERÜHRT.

Ein spürbares

**PROBLEM**



# Palmoplantare Beteiligung bei **3** von **10** Patienten<sup>†,2</sup>

\* PASI 75: 90%; PASI 90: 71%; PASI 100: 40%<sup>1</sup>

† PPASI ≥ 0 in den Studien UNCOVER-1, -2 und -3

PPASI: Palmoplantar Psoriasis Area and Severity Index

*Lilly*

Nach 3 Monaten Taltz®

**DEUTLICH GEBESSERT**



**7 von 10**

Patienten erreichten

**PPASI 75<sup>‡</sup>** (vs. 4 von 10 mit  
Etanercept,  $p < 0,05$ )<sup>§,2</sup>



**5 von 10**

Patienten erreichten

**PPASI 100<sup>‡</sup>** (vs. 3 von 10 mit  
Etanercept,  $p < 0,05$ )<sup>§,2</sup>

- Bereits nach 1 Woche zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen (PPASI 75).<sup>2</sup>
- Die Verbesserungen blieben bei Behandlung über 11 Monate bestehen oder nahmen weiter zu.<sup>1,2</sup>

<sup>‡</sup> Ausgangswert PPASI  $\geq 8$  = entspricht mittelschwerem bis schwerem Befall (N = 350);  
<sup>§</sup> UNCOVER-2 und -3; <sup>¶</sup> UNCOVER-3

**taltz®**  
(Ixekizumab)

**BEFREIT.\***  
**BERÜHRT.**



## LillyPlus – Wir empfehlen unser kostenloses Patienten-Begleitprogramm für Menschen mit Psoriasis

Unterstützung bei Alltagsfragen:

- › Handhabung des Taltz®-Fertigpens oder der Taltz®-Fertigspritze
- › Reisevorbereitungen
- › Praktische Alltagstipps sowie Tipps zur Haut- und Haarpflege

**Die Lilly Pharmareferenten stellen Ihnen gerne Anmeldeunterlagen für Ihre Patienten zur Verfügung oder Sie können diese bei unserer medizinischen Information unter der Nummer 061 72–27 32 222 anfordern.**

Ein Video zur Injektion von Taltz® finden Ihre Patienten auf [www.taltz.de](http://www.taltz.de), zugänglich mit dem Passwort „HAUT“.

\*PASI 75: 90%; PASI 90: 71%; PASI 100: 40%<sup>1</sup>

1 Taltz® Fachinformation, Stand Oktober 2016; 2 Menter A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Mar 21. doi: 10.1111/jdv.14237. [Epub ahead of print]

**Taltz® Zulassungsinhaber:** Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Niederlande; Ansprechpartner in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2-4, D-61352 Bad Homburg. **Bezeichnung der Arzneimittel:** Taltz® 80 mg Injektionslösung in einem Fertigpen/in einer Fertigspritze. **Zusammensetzung:** *arzneilich wirksamer Bestandteil:* Fertigpen/Fertigspritze enthält 80 mg Ixekizumab in 1 ml Lösung *Hilfsstoffe:* Natriumcitrat, Zitronensäure (wasserfrei), Natriumchlorid, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. **Gegenanzeigen:** Schwerwiegende Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe). Klinisch relevante aktive Infektionen, z.B. aktive Tuberkulose. **Nebenwirkungen:** Sofortiger Behandlungsabbruch und Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe beim Auftreten folgender Nebenwirkungen: Mögliche schwerwiegende Infektion ( $\leq 1$  von 100 Personen), mögliche Anzeichen sind: Fieber, grippeartige Symptome, nächtliches Schwitzen, Müdigkeitsgefühl oder Kurzatmigkeit; anhaltender Husten, warme, gerötete und schmerzhaft Haut oder schmerzhafter Hautausschlag mit Bläschen. Schwerwiegende allergische Reaktion (Häufigkeit aufgrund verfügbarer Daten nicht abschätzbar), zu möglichen Anzeichen zählen: Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Hals, starker Juckreiz der Haut mit rotem Ausschlag oder Hauterhebungen. **Andere Nebenwirkungen:** Sehr häufig ( $> 1$  von 10 Personen): Infektionen der oberen Atemwege mit Symptomen wie Halsschmerzen und verstopfter Nase (Nasopharyngitis); Reaktionen an Injektionsstelle (z. B. gerötete Haut, Schmerzen). Häufig ( $\leq 1$  von 10 Personen): Übelkeit, Tinea-(Pilz)infektionen wie Fußpilz; Schmerzen im hinteren Halsbereich. Gelegentlich ( $\leq 1$  von 100 Personen): Mundsoor (orale Candidose), Grippe, laufende Nase, bakterielle Hautinfektion, Nesselsucht, Augenausfluss mit Juckreiz, Rötung und Schwellung (Bindehautentzündung); Anzeichen geringer Anzahl weißer Blutkörperchen, wie Fieber, Halsschmerzen und Mundgeschwüre infolge von Infektionen (Neutropenie); niedrige Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie). Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht verwenden, falls Siegel gebrochen ist. Nicht schütteln. Verschreibungspflichtig. (Stand April 2016)