

# FOBI Woche München 2018

Wir freuen uns auf Sie!

Dienstag, 24. Juli 2018  
bis Samstag, 28. Juli 2018

Internationales Congress Center  
München (ICM)  
Am Messesee in 81823 München

## Taltz® – Programm

- **Abendessen** am Dienstag, 24. Juli 2018 um 19:30 Uhr
- **Lilly Mittagssymposium** „Sprechstunde Psoriasis: 16 Monate praktische Erfahrungen mit Taltz® – Neueste Daten und spannende Fälle“ am Mittwoch, 25. Juli 2018, von 13:00–14:00 Uhr
- **Lilly Frühstücksseminar** „Einführung in die Biologika-Therapie am Beispiel der Psoriasis“ am Donnerstag, 26. Juli 2018, von 8:00–8:45 Uhr
- **Abendessen** am Donnerstag, 26. Juli 2018 um 19:30 Uhr

### Für alle anderen Fragen, finden Sie uns während der FOBI am Taltz® Stand:

Unseren Stand finden Sie direkt im Foyer F.17. Folgen Sie einfach den grünen Fußspuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

### Virtuelle Realität:

Das geht unter die Haut! Auch im Obergeschoss sind wir für Sie da. Lernen Sie dank virtueller Realität die Schuppenflechte von einer ganz neuen Seite kennen. Stand OG.09 direkt neben der Rolltreppe im 1. OG.

**taltz®**  
(Ixekizumab)  
von *Lilly*

# Taltz® – Programm im Detail

- **Abendessen am Dienstag, 24. Juli 2018 um 19:30 Uhr:** Als Auftakt zur FOBI Woche freuen wir uns, Sie bereits am Dienstagabend zu einem gemütlichen Abendessen im Gasthaus Biermann, in Laufnähe des Kongresses, begrüßen zu dürfen. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Ihren betreuenden Außendienst-Mitarbeiter.  
Gasthaus Der Biermann, Riemer Strasse 350, 81829 München
- **Lilly Mittagssymposium „Sprechstunde Psoriasis“:** 16 Monate praktische Erfahrungen mit Taltz® – Neueste Daten und spannende Fälle: Am Mittwoch von 13:00–14:00 Uhr führen Sie PD Dr. Andreas Körber und Dr. Andreas Pinter durch praktische Fälle mit Taltz®. Zur Stärkung haben wir Lunchpakete für Sie vorbereitet!  
Saal 13b
- **Lilly Frühstücksseminar „Einführung in die Biologika-Therapie am Beispiel der Psoriasis“:** Frühaufsteher aufgepasst! Am Donnerstag von 8:00–8:45 Uhr findet unser Frühstücksseminar mit Prof. Dr. Petra Staubach-Renz und PD Dr. Sascha Gerdes statt. Auch hier ist für Ihre Verpflegung gesorgt!  
Saal 02
- **Abendessen am Donnerstag, 26. Juli 2018 um 19:30 Uhr:** Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen – gerne auch bei einem gemütlichen Abendessen am Donnerstagabend im Wirtshaus in der Au. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Ihren betreuenden Außendienst-Mitarbeiter.  
Wirtshaus in der Au, Lilienstrasse 51, 81669 München

**Zulassungsinhaber:** Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Niederlande; Ansprechpartner in Deutschland: Lilly Deutschland GmbH, Werner-Reimers-Str. 2–4, D-61352 Bad Homburg. **Bezeichnung der Arzneimittel:** Taltz® 80 mg Injektionslösung in einem Fertigpen/in einer Fertigspritze. **Zusammensetzung: arzneilich wirksamer Bestandteil:** Fertigpen/Fertigspritze enthält 80 mg Ixekizumab in 1 ml Lösung. **Hilfsstoffe:** Natriumcitrat, Zitronensäure (wasserfrei), Natriumchlorid, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Plaque-Psoriasis: Behandlung mit Taltz® von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. Psoriasis-Arthritis: Behandlung mit Taltz® allein oder in Kombination mit Methotrexat von erwachsenen Patienten mit aktiver Psoriasis-Arthritis, die unzureichend auf eine oder mehrere DMARDs angesprochen oder diese nicht vertragen haben. **Gegenanzeigen:** Schwerwiegende Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile (Hilfsstoffe). Klinisch relevante aktive Infektionen, z. B. aktive Tuberkulose. **Schwerwiegende Nebenwirkungen:** Sofortiger Behandlungsabbruch und Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe beim Auftreten folgender Nebenwirkungen: Mögliche schwerwiegende Infektion (können bis zu 1 von 100 Personen betreffen), mögliche Anzeichen sind: Fieber, grippeartige Symptome, nächtliches Schwitzen, Müdigkeitsgefühl und Kurzatmigkeit; anhaltender Husten, warme, gerötete und schmerzhaft Haut oder schmerzhafter Hautausschlag mit Bläschen. Schwerwiegende allergische Reaktion (können bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen), zu möglichen Anzeichen zählen: Schwierigkeiten beim Atmen oder Schlucken, niedriger Blutdruck, der zu Schwindel oder Benommenheit führen kann, Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Hals, starker Juckreiz der Haut mit rotem Ausschlag oder Hauterhebungen. **Anderer Nebenwirkungen:** Sehr häufig (können mehr als 1 von 10 Personen betreffen): Infektionen der oberen Atemwege mit Symptomen wie Halsschmerzen und verstopfter Nase (Nasopharyngitis); Reaktionen an Injektionsstelle (z. B. gerötete Haut, Schmerzen). Häufig (können bis zu 1 von 10 Personen betreffen): Übelkeit, Tinea-(Pilz)infektionen wie Fußpilz; Schmerzen im hinteren Halsbereich, Herpes an Mund, Haut und Schleimhäuten (Herpes simplex, mukokutan). Gelegentlich (können bis zu 1 von 100 Personen betreffen): Mundsoor (orale Candidose), Grippe, laufende Nase, bakterielle Hautinfektion, Nesselsucht, Augenausfluss mit Juckreiz, Rötung und Schwellung (Bindehautentzündung); Anzeichen geringer Anzahl weißer Blutkörperchen, wie Fieber, Halsschmerzen oder Mundgeschwüre infolge von Infektionen (Neutropenie); niedrige Blutplättchenzahl (Thrombozytopenie), Ekzem, Ausschlag, plötzliches Anschwellen von Gewebe an Hals, Gesicht, Mund oder Rachen (Angioödem). **Warnhinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht verwenden, falls Siegel gebrochen ist. Nicht schütteln. Weitere Warnhinweise s. Fachinformation. **Verschreibungspflichtig.** (Stand: Januar 2018)

Lilly

taltz®  
(Ixekizumab)