

Der spezifische Lilly Letter Urologie im Wandel – Danke für Ihre Treue!



Unser spezifischer Lilly Letter Urologie wandelt sich. Für Ihre langjährige Treue möchten wir uns ganz herzlich bedanken und hoffen, auch weiterhin mit Ihnen über unser Lilly Letter-Angebot in Verbindung zu bleiben. Wir führen diesen Letter ab der nächsten Ausgabe in den allgemeinen Lilly Letter über.

Seit vielen Jahren ist Lilly in der Urologie tätig. Aktuell erforschen wir in diesem Bereich verschiedene Moleküle, die sich noch in sehr frühen Phasen der klinischen Entwicklung befinden. Aus diesem Grund verabschiedet sich der spezifische Lilly Letter Urologie heute von Ihnen. Sie haben allerdings zukünftig die Möglichkeit, weiterhin Informationen zu Lilly über unseren allgemeinen Lilly Letter zu erhalten. Dieser liefert Ihnen auch nützliche Tipps für Ihren Praxisalltag, zum Beispiel rund um die Kommunikation mit Patienten, die Mitarbeiterführung oder zur Praxisorganisation. Die Überführung in diesen allgemeinen Lilly Letter geschieht automatisch. Selbstverständlich können Sie den Service jederzeit abbestellen, nutzen Sie dazu einfach den untenstehenden Link.

Cialis® bleibt im Original in allen Dosierungen (5 mg für die Konstanztherapie bei Erektile Dysfunktion (ED) und Benignem Prostatasyndrom (BPS), 10 bzw. 20 mg für die Bedarfstherapie bei ED) für Ihre Patienten verfügbar. Bitte lassen Sie Ihre Patienten auch weiterhin von Cialis® profitieren.

Nutzen Sie gerne auch zukünftig unseren Service: Sie erreichen die Medizinische Information telefonisch unter 06172 / 273 2222 oder per Mail unter med_info@lilly.com. Als weitere Informationsquelle können Sie zudem die Webseite www.cialis.de besuchen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Bitte kommen Sie bei Rückfragen gerne auch direkt auf uns zu.

Sara Patzak-Pfeifer
Sr. Business Unit Director, Bio-Medicines



Für diese Patienten kann sich Cialis® eignen:

Zur Behandlung der **Erektile Dysfunktion** ist Tadalafil der einzige PDE5-Hemmer, der in Deutschland für die Konstanztherapie (5 mg täglich) zugelassen ist. Innerhalb von 5 Tagen kann sich bei Ansprechen auf die Therapie ein konstanter Wirkspiegel aufbauen, so dass mit Cialis® eine vom Zeitpunkt der Tabletteneinnahme losgelöste Sexualität möglich ist.¹ Die Konstanztherapie ist daher eine geeignete Option für Paare, die ihre Sexualität nicht im Voraus planen möchten, sondern sich einen entspannten Umgang mit dem Liebesleben fast wie vor der ED wünschen. Durch die Konstanztherapie kann sich sowohl das sexuelle Selbstvertrauen der Patienten² als auch die sexuelle Lebensqualität des Paares insgesamt verbessern.³ Die Zufriedenheit mit der Cialis®-Konstanztherapie ist sehr hoch, wie die nicht-interventionelle EDATE-Studie zeigte: 86 Prozent der Männer setzten sie auch nach Studienende für mindestens 6 weitere Monate als Selbstzahler fort.⁴ Die Bedarfstherapie (10 bzw. 20 mg) mit Cialis® ist besonders für Paare geeignet, die zum Beispiel nur am Wochenende Zeit füreinander haben und daher vom extrabreiten 36-Stunden-Wirkzeitfenster profitieren können.¹

Als einziger PDE5-Hemmer ist Tadalafil 5 mg täglich auch für die Behandlung des **Benignen Prostatasyndroms** zugelassen und in dieser Indikation erstattungsfähig. Die Konstanztherapie mit Cialis® stellt für BPS-Patienten eine bewährte Alternative dar, wenn sie mit der Wirkung der bisherigen Medikation, wie z. B. dem α -Blocker Tamsulosin, unzufrieden sind oder diese nicht vertragen. Wie die Ergebnisse einer Studie nahelegen, hat Tadalafil eine vergleichbare Wirkung auf die Verbesserung des IPSS (International Prostate Symptom Score) wie Tamsulosin (keine head-to-head-Studie, jeweils gegenüber Placebo).⁵

Referenzen

- 1 Fachinformation Cialis®, Stand: März 2017.
- 2 Rubio-Aurioles E et al. A randomized open-label trial with a crossover comparison of sexual self-confidence and other treatment outcomes following tadalafil once a day vs. tadalafil or sildenafil on-demand in men with erectile dysfunction. J Sex Med 2012; 9: 1418-1429.
- 3 Rubio-Aurioles E et al. Impact on erectile function and sexual quality of life of couples: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial of tadalafil taken once daily. J Sex Med 2009; 6: 1314-1323.
- 4 Buvat J et al. Continuation and effectiveness of tadalafil once daily during a 6-month observational study in erectile dysfunction: the EDATE study. Int J Clin Pract 2014; 68: 1087-1099.
- 5 Oelke M et al. Monotherapy with tadalafil or tamsulosin similarly improved lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia in an international, randomised, parallel, placebo-controlled clinical trial. Eur Urol 2012; 61: 917-925.