



Adcirca®-Rabattverträge der Lilly Deutschland GmbH (Stand Juni 2018)

Für Cialis® (Tadalafil; 5mg) bestehen Rabattverträge zwischen der Lilly Deutschland GmbH und den nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge genannten Krankenkassen.

Die Verträge beinhalten nur Originalware (deutsche Ware, keine Parallel- oder Reimporte).

Krankenkasse	Vertragsstart	Vertragsende
Actimonda	01.02.2018	
AOK Niedersachsen	01.02.2018	
AOK Plus	01.02.2018	
AOK RP	01.02.2018	
Atlas BKK	01.02.2018	
Audi BKK	01.02.2018	
Bahn BKK	01.02.2018	
Barmer GEK	01.02.2018	
Bertelsmann GKK	01.02.2018	
Big Direkt Gesund	01.02.2018	
BKK 24	01.02.2018	
BKK Achenbach Buschhütten	01.02.2018	
BKK Aesculmap	01.02.2018	
BKK Akzo Nobel Bayern	01.02.2018	
BKK Aschenbach Buschhütten	01.02.2018	
BKK B. Braun Melsungen	01.02.2018	
BKK Bayrische Staatsbauverwaltung	01.02.2018	
BKK BPW Bergische Achsen	01.02.2018	
BKK Deutsche Bank	01.02.2018	
BKK Deutsche Linoliumwerke	01.02.2018	
BKK Diakonie	01.02.2018	
BKK Dürkopp Adler	01.02.2018	
BKK Euregio	01.02.2018	
BKK evm	01.02.2018	

BKK EWE	01.02.2018	
BKK exklusiv	01.02.2018	
BKK Faber-Castell	01.02.2018	
BKK firmus	01.02.2018	
BKK Freudenberg	01.02.2018	
BKK Gildemeister Seidensticker	01.02.2018	
BKK Grillo Werke	01.02.2018	
BKK Henschel Plus	01.02.2018	
BKK Herford Minden Ravensberg	01.02.2018	
BKK Herkules	01.02.2018	
BKK Linde	01.02.2018	
BKK Mahle	01.02.2018	
BKK Melitta Plus	01.02.2018	
BKK Miele	01.02.2018	
BKK Mobil Oil	01.02.2018	
BKK Pfaff	01.02.2018	
BKK Pfalz	01.02.2018	
BKK PricewaterhouseCoopers	01.02.2018	
BKK ProVita	01.02.2018	
BKK Public	01.02.2018	
BKK PwC	01.02.2018	
BKK Rieker Ricosta Weiser	01.02.2018	
BKK RWE	01.02.2018	
BKK Salzgitter	01.02.2018	
BKK Scheufelen	01.02.2018	
BKK Stadt Augsburg	01.02.2018	
BKK Technoform	01.02.2018	
BKK Textilgruppe Hof	01.02.2018	
BKK VBU	01.02.2018	
BKK VDN	01.02.2018	
BKK VerbundPlus	01.02.2018	
BKK Verkehrsbau Union	01.02.2018	
BKK Werra-Meissner	01.02.2018	
BKK Wirtschaft und Finanzen	01.02.2018	

BKK Würth	01.02.2018	
BKK ZF & Partner	01.02.2018	
Bosch BKK	01.02.2018	
Brandenburgische BKK	01.02.2018	
Continental BKK	01.02.2018	
Debeka BKK	01.02.2018	
Energie BKK	01.02.2018	
Energie BKK	01.02.2018	
Ernst & Young BKK	01.02.2018	
EY BKK	01.02.2018	
Handelskrankenkasse	01.02.2018	
Hanseatische Krankenkasse	01.02.2018	
Heimat Krankenkasse	01.02.2018	
IKK Brandenburg und Berlin	01.02.2018	
IKK gesundplus	01.02.2018	
IKK Nord	01.02.2018	
IKK Nordwest	01.02.2018	
KKH kaufmännische Krankenkasse	01.02.2018	
Knappschaft	01.02.2018	
Metzinger BKK	01.02.2018	
mhplus Betriebskrankenkasse	01.02.2018	
Mhplus BKK	01.02.2018	
Novitas BKK	01.02.2018	
NOVITAS BKK	01.02.2018	
Pronova BKK	01.02.2018	
R+V BKK	01.02.2018	
Salus BKK	01.02.2018	
Securvita BKK	01.02.2018	
Siemag BKK	01.02.2018	
SIEMAG BKK	01.02.2018	
Siemens BKK	01.02.2018	
SKD BKK	01.02.2018	
SVLFG	01.02.2018	
TBK Thüringer BKK	01.02.2018	

Techniker Krankenkasse	01.02.2018	
TUI BKK	01.02.2018	
VIACTIV Krankenkasse	01.02.2018	
Viaktiv KK	01.02.2018	
Wieland BKK	01.02.2018	
WMF BKK	01.02.2018	

Drucken Sie diese Übersicht ganz einfach aus und fügen Sie diese Ihrer Dokumentation hinzu.

Für medizinische Fragen im Zusammenhang mit Adcirca® steht Ihnen die Medizinische Information zur Verfügung:

Telefon: 06172 - 273 22 22 (montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

Telefax: 06172 - 273 20 30

Pflichttext:

ADCIRCA 20 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Tadalafil. **Zusammensetzung:** Jede Tablette enthält 20 mg Tadalafil. **Sonstige Bestandteile:** Lactose (233 mg), Croscarmellose-Natrium, Hyprolose, mikrokristalline Cellulose, Natriumdodecylsulfat, Magnesiumstearat, Hypromellose, Triacetin, Titandioxid (E171), Eisen (III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Eisen (III)-oxid (E172), Talkum. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung der pulmonalen arteriellen Hypertonie (PAH) der WHO-Funktionsklasse II und III zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei Erwachsenen. Die Wirksamkeit wurde gezeigt bei idiopathischer PAH (IPAH) und bei PAH aufgrund einer Kollagenose. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Herzinfarkt während der vorangegangenen 90 Tage. Schwere Hypotonie (< 90/50 mm Hg). Einnahme von organischen Nitraten in jeglicher Form, ADCIRCA verstärkt die blutdrucksenkende Wirkung von Nitraten. Begleittherapie mit Guanylatcyclase-Stimulatoren wie Riociguat, da es möglicherweise zu einer symptomatischen Hypotonie kommen kann. Verlust der Sehkraft auf einem Auge durch eine nicht arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION). **Nebenwirkungen:** Nebenwirkungsdaten von Patienten über 75 Jahren sind begrenzt. In der folgenden Auflistung sind auch einige unerwünschte Ereignisse / Nebenwirkungen enthalten, die aus klinischen Studien und/oder seit Markteinführung von Tadalafil zur Behandlung der erektilen Dysfunktion bei Männern berichtet wurden.

Sehr häufig (≥1/10): Kopfschmerzen, Hautrötung, Epipharyngitis (einschließlich Schleimhautschwellungen der Nase und Nasennebenhöhlen und Rhinitis), Übelkeit, Dyspepsie (einschließlich abdominale Schmerzen/ Beschwerden), Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Schmerzen in den Extremitäten (einschließlich anderer Beschwerden in den Extremitäten). **Häufig (≥1/100 bis <1/10):** Überempfindlichkeitsreaktionen, Ohnmacht, Migräne, verschwommenes Sehen, Palpitationen, Hypotonie, Epistaxis, Erbrechen, gastroösophagealer Reflux, Hautausschlag (Rash), vermehrte uterine Blutung (veränderter/verstärkter Menstruationsblutung, wie Menorrhagie, Metrorrhagie, Menometrorrhagie oder vaginale Blutungen), Gesichtssödem, Brustschmerz. **Gelegentlich (≥1/1000 bis <1/100):** Krampfanfälle, vorübergehende Amnesie (Gedächtnisstörung), Tinnitus, plötzlicher Herztod, Tachykardie, Hypertonie, Urtikaria, Hyperhidrosis (Schwitzen), Hämaturie, Priapismus, Penishämorrhagie, Hämatospermie. **Nicht bekannt (kann auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden):** Angioödem, Schlaganfall (einschließlich hämorrhagische Ereignisse), nicht arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION), Augenvenenverschluss, Gesichtsfeldausfall, plötzliche Taubheit, instabile Angina pectoris, ventrikuläre Arrhythmien, Herzinfarkt, Stevens-Johnson-Syndrom, exfoliative Dermatitis, länger andauernde Erektionen. **Warnhinweise:** Enthält Lactose (als Monohydrat). Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen, weitere Warnhinweise s. Fachinformation. **Verschreibungspflichtig. Pharm. Unternehmer:**

Eli Lilly Nederland B.V.; Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Niederlande

Stand der Information: Januar 2016

